

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十六

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻漸

謄錄監生臣方汝觀

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十六

明周王朱橚撰

黃疸門

三十六黃

附論

論曰黃病有三十六種所載名數雖同而證候各異皆非黃疸之比求之於經無所稽考然此病中原之人未曾識唯東南方往往有之其狀與熱病相似俚俗能辨之者其口中血脉即知是黃乃施點烙鍼灸多致瘥安

者大抵東南之域其地濕其氣熱濕熱相蒸易成瘴毒  
人感其邪有此黃病療不及時則傷害至速灸烙方治  
不可緩也

方

心黃第一

病人面赤口張氣喘多驚饒睡手脚煩疼舌上生瘡心  
下急悶不欲飲食舌縮口乾七八日內心發狂走即是  
心黃先烙上管穴次烙關元及灸十八壯若不瘥再灸

七炷次烙背心下廉穴及天臆如不瘥再服

柴胡湯

柴胡

去苗枳殼

白升麻

黃連

各一兩

麻黃

去根節一兩五錢

甘草

炙

知母

焙

梔子仁

各三兩

右為散每服五錢水一盞半煎至七分食後溫服日三飲少熱粥以助藥力汗出為度

肝黃第二

病人齒黃目如丹赤口燥熱渴氣力虛劣身體青黃即

是肝黃眼中血出氣息急者不堪醫先灸肝俞次烙心  
俞及上鬲灸下廉次烙臍下三寸次烙中脘陽明二穴  
若不瘥灸天臑及心膻各百壯又不瘥即作土漿服之  
又不瘥宜服知母湯灸烙百會

土漿方

人糞

半盞用新汲水三升調入地坑中攪百遍濾取汁二合

青蒿汁

一合如無汁取

末二錢

右入生薑汁半合和勻頓服不拘時

知母湯

聖惠  
總錄

知母

焙五錢

柴胡

去苗

茵陳蒿

甘草

炙

常山

焙

鱉甲

醋炙去裙  
襴各三分

右麤搗篩每服五錢匕水一盞入豉一百粒同煎至七分去滓入煉了猪脂半合攪勻食前溫服吐利為度

脾黃第三

病人兩頰上青脉起目黃齒斷背青唇黑生瘡通身黃

色鼻中煤生心腹脹滿不下飲食大便不通即是脾黃  
先烙頰上青脉次烙脾俞及胃脘及陰都穴不瘥灸脾  
俞百壯宜服

豬苓湯

聖惠  
總錄

豬苓

去皮

黃芩

去心

大黃

梔子仁

朴硝

各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空  
心溫服

鹽蜜煎

聖惠  
總錄

治脾黃脹滿氣冲胸膈大腸不通



鹽

為末  
五錢  
蜜二  
合  
皂莢  
為末  
一分

右先將鹽入銚子內次下蜜皂莢末慢火煎候冷丸如棗核大以膩粉滾為衣納下部中良久大便通利

肺黃第四

病人口乾舌縮目赤鼻血出先烙足心次烙心俞百會天臆裏廉肺俞丹田等穴若不瘥即灸肺俞期門氣海穴百壯若煩渴欲得飲水及大便秘不利宜服之

黃硝湯

聖濟  
總錄

大黃炒硝石

各五錢

右和勻水二盞煎至一盞去滓空心分溫二服

腎黃第五

病人腳冷面目俱青身上冷臍下結鞭氣急衝心先烙  
腎穴次烙期門氣海足陽明兩手心天聽百會等穴若  
不瘥灸氣海期門下廉腎俞百壯宜候之如氣聲重呼  
吸勻即堪醫若氣連呼三聲吸氣不入者不堪醫者也  
灸兩乳下三七壯不瘥宜服

雞參飲

聖濟  
總錄

雞子

去殼  
一枚

人參

一兩  
蜜

生薑汁

半合

朴硝

一分與雞  
子同研勻

右先將人參薑蜜用水一升煎至七合去滓入雞子

朴硝攪和更煎五七沸空心頓服

芸薹飲

聖濟  
總錄

治病人手足俱急眠卧艱難

芸薹子

萵苣子

各一  
兩

右同研如泥入新汲水一盞攪和後以生絹濾取汁

頓服之

鬼黃第六

病人汗不出漸加困重愒氣心脹脣黑徧身黃妄見鬼物道得古人名字此是鬼黃宜烙中脘穴更灸二七壯次烙背心及灸上顙一七壯又烙心俞肝俞腎俞如瘡即徧身赤色汗流如雨喘氣調勻此為可救如身體青脉息漸微胃脉絕者死如無此候宜服

龍齒湯

聖濟  
總錄

龍齒

麥門冬

去心人參

各一兩

遠志

去心三分

甘草

炙到一分

右粗為篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

姦黃第七

病人向明卧多愛索鞋擬起身體全冷肉蒼色睡中啼泣或狂言妄語此是姦黃先烙手心次烙第三指間又灸一七壯次烙氣海上腕人中神庭等穴不瘡灸背心下廉穴百壯候之如背心腫脚腫驀回窺人者不堪醫也如無此候宜服

茯神湯

聖濟  
總錄

茯神

去木  
心

酸棗仁

炒

人參

各一  
兩

附子

炮去  
皮

乾薑

炮一  
分

右㕮咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食前溫服

血黃第八

病人三日鼻中出血大小便亦下血心間煩悶腹中有  
塊痛如虫咬吐逆喘粗此是血黃先烙丹田穴次烙後

心上顫不瘥者宜服

續隨湯

聖濟  
總錄

用續隨子十四粒細研水一盞煎至六分去滓放冷  
頻服當吐瀉愈看鼻衄及下血其血鮮者堪醫如齒  
及鼻黑髮直者死

茅根湯

聖濟  
總錄

治血黃頭悶心中痛結塊心煩吐逆

生茅根

一握  
剉

生地黄

一兩  
折碎

刺薊

五錢  
剉

右以水三盞煎至一盞半去滓食後分溫二分

人黃第九

病人面青掩口惡聞人聲或似顛狂此是人黃急宜灸  
烙承漿穴次烙第三椎次烙下脘次烙期門不瘥灸肺  
俞後心百壯若脉息動止常共鬼語此不堪治若無此  
證宜服

赤箭散

赤箭

一天竺黃

五錢

牛黃

一分

鉛白霜

錢一

右為散和勻服一錢匕食後煎金銀湯下



髓黃第十

病人四肢疼痛無力好眠冷地身體徧黃次變青綠色起脣齒俱白眼帶微腫宜灸下廉及兩手陽明穴百會等每處各三十五壯若身體赤色宜服

黃耆散

黃耆

劉

黃連

去

甘草

炙各五錢

黃芩

去心一兩

右為散每服三錢匕粳米泔調下不拘時

癰黃第十一

病人色青次却色赤或頸後髮自落喫食漸少吐逆心煩夢與鬼交氣力虛乏或食物難消宜灸臍下百壯得力者肉色漸變如是小便赤澁鼻中煤生齒焦眼黑不堪治也若無此候宜服

桑礪硝湯

桑礪硝

炒

白朮

黃耆

赤茯苓

去

皮人參

各一兩

甘

草

灸五錢

右為散每服五錢匕水一盞半入生薑棗大拍碎同

煎七分去滓食前溫服

急黃第十二

病人心腹急悶煩躁身熱五日之間便發狂走體如金色起卧不安此是急黃先烙百會次烙下廉再烙肝俞更灸三十壯不瘥灸神庭天牕後心百壯宜用

吹鼻方

瓜蒂

七枚  
為末

亂髮

燒灰  
一錢

右同研勻每用少許吹鼻中

又方

惡實

一兩

黃芩

去心  
五錢

右粗搗篩用水一盞半煎至半盞去滓入馬通汁一合攪令勻更煎一二沸食前分二溫服若是齒如熟豆色嘔氣心頭鞭者不可治也

氣黃第十三

病人初得先從兩腳黃腫大小便難心中戰悸面目虛黃不能食宜服

葫蘆飲

用苦葫蘆穰不以多少以水研服少許須臾吐出瘥

痢黃第十四

病人身如金色不多言語四肢無力好眠卧口吐黏涎者宜服

茵陳湯

茵陳蒿 白鮮皮

各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分食前溫服

日三

白黃第十五

病人顏色乾枯目下赤口乾舌縮心中恍惚四肢煩重  
此是白黃先烙舌上青脉次烙上腕魂門二穴灸二十  
壯不瘥灸百會氣海百壯宜服

地黃當歸湯

地黃汁

五合如無生以乾地黃  
三兩水漬研汁代之

蜜二合當歸

白朮

各一  
兩

右先將當歸白朮用水二盞煎至一盞去滓下地黃汁并蜜和勻分作三服相繼服盡若患人言語錯亂者十死不治也

陰黃第十六

病人寒熱并十指冷痛鼻中生煤此是陰黃先烙上脘穴更灸二十壯次烙氣海下廉內乳等穴不瘥灸氣海天臆百壯更服麻黃梔子湯若唇反者不可治也

麻黃梔子湯

麻黃

去根節  
五錢

梔子仁七枚 甘草

炙三分

右各細剉用水二盞煎至一盞去滓食後分二溫服

膽黃第十七

病人身上黃綠色胸中氣滿或硬不下飲食此是膽黃  
先烙膽俞下腕穴次烙手足心并十指次烙心俞百會  
神庭風門穴不瘥灸膽俞并後心百壯宜服

黃芩湯

黃芩

去心  
三分

芍藥

一兩  
五錢



右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食  
後溫服

驚黃第十八

病人面青身黃心煩亂起卧不安脣裏生瘡目視眊眊  
此是驚黃先烙上腕次烙風池心俞下廉穴如不瘥灸  
後心兩傍一寸五分各二十壯宜服

牡荊湯

牡荊子

白朮

各五錢

芒硝

一分研  
湯化下

右細剉以水二盞煎至一盞去滓下芒硝攪令勻食後溫服如病人望之色青近之色白身體涼冷言語帶邪氣急衝心汗出不多此是死候也

風黃第十九

病人愛笑腰背急手足強口乾舌上生瘡三部脈亂此是風黃先烙肺俞次烙第三椎風門兩旁相去各三寸又烙手心及烙足陽明氣海陰都百會下廉腎俞不瘥更灸神庭天牕氣海後心下百壯宜服

麻黃湯

麻黃

去根節

葛根

白朮

各一兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

走精黃第二十

病人惛惛饒睡四肢疼痛面目俱黃舌上紫色甚則舌面拆裂及加黑色皆是走精黃宜用藥烙之

治走精黃

牛脂一兩半  
兩豉半合

右煎過牛脂以綿裹作包子於舌上烙去一重黑皮  
濃煎豉湯一盞飲之不瘥者灸上顙穴百會穴後心  
氣海百壯名小甲黑者不可治若得睡喘息勻者生  
酒黃第二十一

病人五臟積熱面赤語言帶邪昏錯亂目中黃色此是  
酒黃灸後心百會下廉三處百壯若是噉氣上喘脉如  
屋漏此候不治如祇大便下血宜服

澤瀉散

澤瀉

剉

黃芩

去心

白鮮皮

茵陳蒿

阿膠

炙

炒各一兩

甘草

炙三分

右為散每服一錢半空心米飲調下日三

雞黃第二十二

病人面目俱青好向暗處眠卧不欲見明手捉衣服狀如鬼神望見黃花生者此是雞黃六日堪醫七日難治宜先烙大權次烙風府及手心更灸後心天臆百壯即

瘡若脚冷腰疼搐掣左足眼睛忽陷不可治也如無此  
狀宜服

地黃飲

地黃

八兩肥嫩者洗

黃雌雞

一隻去毛腸胃細剉

右用水一斗煮至五升去滓一日徐次服盡一方以  
地黃納雞腹中繫定於銅器中蒸令熟絞取汁分五  
服不拘時溫服

蚰蜒黃第二十三

病人身體涼冷舌上黑脉及兩頰有青脉起目黃時時  
變異腦如針刺頭旋欲倒者是蚰蜒黃宜先烙青脉令  
斷次烙舌上黑脉及舌根兩傍更烙章門百會不瘥即灸  
氣海下廉百壯宜服

驢乳方

用驢乳一二升頓服若舌上有黑黃色鼻乾不得睡  
面帶青色不可治也

火黃第二十四

病人先體熱身赤午後却涼偏身有赤點起宜烙脚心  
背心手心百會下廉即瘥如生黑點不可療也若無黑  
點宜服

紫草湯

紫草

去苗

吳藍

各一兩

木香

黃連

去鬚各五錢

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食  
後溫服

走馬黃第二十五



病人眼黃面赤狂言罵詈怒目高腎起卧不安發即狂走先烙髮際次烙風門上腕及關元又烙下廉并兩手足心即瘥宜服

竹葉湯

聖濟  
總錄

竹葉

一握  
細切

小麥

二合

生薑

一兩

白馬通

新者絞取汁

二合

湯成下

右用水三盞先煮麥取二盞去麥下竹葉生薑煎至一盞半去滓入白馬通汁一合和勻分溫二服

房黃第二十六

病人身體沉重狀似著熱不得睡卧小便黃色眼赤如  
朱心下塊起狀若癡人如此証候十無一生先烙上脘  
及心俞次烙舌下灸關元下廉百壯宜服

燒衣灰方

取婦人內衣燒灰細研每服二錢匕溫酒調下

黑黃第二十七

病人身面黑黃口脣兩頰上有青脉起出於口角者十  
無一生亦有脉息沉細喫食不妨身如土色宜先烙口

中黑脉次烙百會穴又烙玉泉足陽明穴章門心俞下  
廉不瘥宜服

鬼臼方

聖濟  
總錄

用生鬼臼一兩絞取汁一小盞服之即瘥如無生鬼  
臼即用乾者擣為末每服二錢新汲水調下不拘時  
服

厭黃第二十八

病人四肢煩疼手足無力吐逆不下飲食漸漸瘦弱先

烙玉泉及灸三十壯次烙口中黑脉并曲池灸裏廉後  
心百壯如未瘥宜服

大黃湯

聖濟  
總錄

大黃

剉炒

木香

枳殼

去穢炒  
各一兩

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食  
前溫服

水黃第二十九

水黃之狀面目俱青狂言妄語聲咽不出先烙關元次

烙下廉百俞髮際不瘡灸後心氣海百俞百壯宜服

大黃甘草湯

聖濟  
總錄

大黃

剉炒

甘草

炙各  
五錢

右剉如麻豆大每服用水一盞煎至六分去滓食後  
溫服

又方

聖濟  
總錄

乾木瓜

一兩

芥子

半合

陳橘皮

湯洗去白  
剉炒五錢

右剉如麻豆大分為三服每服水一盞半煎至八分

去滓食前溫服

爪黃第三十

爪黃之病口苦舌乾身體急強面目俱黃行履不得言語狂亂四肢疼痛發即便走宜先烙後心次烙氣海足陽明及烙百會灸五心穴各二十七壯未瘥宜服

爪蒂散

聖濟  
總錄

用爪蒂一兩為細末每服五分匕新汲水調下不拘時以利吐為度

腸黃第三十一

治腸黃心中悶絕腸內疼痛狀如刀刺先烙大腸俞次  
烙小腸俞氣海如未瘥宜服

四味黃芩湯

聖濟  
總錄

黃芩

去黑  
心

當歸

各一  
兩

黑豆

半  
合

茅根

五  
錢

右細剉三服每服水一盞半煎至八分去滓食前溫  
服

續黃第三十二

治犢黃舌兩邊先從後起次生向前兩傍有赤脉狀如蚯蚓宜急烙斷毒氣貫舌其狀紫色次灸兩口角及人

口并承漿各二十壯

聖濟  
總錄

氣黃第三十三

治氣黃先從脚膝浮腫大小便難心寒顫掉宜烙百會及兩口角次灸中脘二七壯此黃亦令人多咲七日堪

治八日病過不可治也

聖濟  
總錄

豬黃第三十四



治豬黃口嚼沫從口角出九日不治十日疾勢已過宜  
急灸兩牙關二七壯次灸承漿二十七壯

聖濟  
總錄

### 土黃第三十五

治土黃身體冷面色青宜灸大衝及百會後心髮際百  
壯若面目十指俱青不治也

### 蝦蟆黃第三十六

治蝦蟆黃舌上青脉起七日盛九日病過急烙大權此  
病晝夜不睡宜服

豉枳湯

聖濟  
總錄

豉

二枳子仁

七  
枚

右粗搗篩用水一盞半煎至七分去滓頓服

聖惠方三十六種黃證點烙論并方證

夫諸黃者其皆因傷寒為本五臟互有所傷熱氣相侵  
致使病人精神恍惚六腑不和七神無主情意改變或  
起坐卧不安或狂言妄語忽喜忽悲或寒或熱或即多  
言或即不語多饒喜笑望見鬼神四肢沉重扶舉不行

或即潛身便走氣力倍加如此證候並是五臟熱揜閉  
塞不通療不及時甚損人命或有鼻衄不止口内生瘡  
或有小便不利大便不通有此證候速令點烙依後方  
治療可得痊平也

方證

肝黃證候

肝黃者面色青四肢拘急口舌乾燥言語蹇滯頭目不  
利爪甲青色若背上浮腫腹脇脹滿者難治烙肝俞三

穴中管穴足陽明二穴及兩臂間手背後

柴胡散

聖惠方

治肝黃

柴胡

一兩去苗

甘草

微炙

車前子

決明子

羚羊角屑

各五錢

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫服

犀角散

聖惠方

治肝黃面色青黃筋脉拘急口乾心躁

小便不利言語或澁

犀角屑 梔子仁 黃芩 羚羊角 升麻

各三兩

柴胡

一兩去苗

龍膽

去蘆頭

甘草

炙各五錢

右為散每服三錢以水一鍾入淡竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服

### 心黃證候

心黃者目赤舌上生瘡心悶喘急多言無度或笑或嘔微微汗出口乾舌短起卧不安神鬼恍惚小便赤難心下脹滿狀如心風悲哭手亂捻物者難治烙心俞二穴

小腸俞二穴 天臆百會 承漿上管關元穴 下廉二穴

生地黃湯 治心黃

生地黃

二兩

淡竹葉

二十片

大麥

半合

甘草

五錢炙

微赤

右細剉和勻 每服五錢水一鍾 入生薑半分 煎至七分 去滓不拘時溫服

馬牙硝散 治心黃 心神恍惚 口乾煩悶

馬牙硝

細研

朱砂

研

龍齒

犀角屑

黃芩

甘草

炙赤各一兩

右研為末，令勻，不拘時候，以生地黄調下二錢，一  
有龍腦無龍齒。

又方

聖惠方

雞子清

二枚鹽

五錢麻油

一合

右相和勻，頓服之，以吐利為度。

脾黃證候

脾黃者，偏身如金色，眼目俱青，脣口生瘡，或吟或詠，有  
時吐逆，不能下食，大便澁，若臍凸者，難治。烙脾俞二穴。

次烙胃脘陰部二穴丹田穴塊穴足陽明二穴

土瓜根散

聖惠方

治脾黃

土瓜根

菰蔞根

甘草

炙微赤

枳殼

麩炒微黃去白各五錢

右為散每服三錢水一鍾煎至五分去滓不拘時溫服

肺黃證候

肺黃者眼目白色頭面微腫鼻衄不止多涕憎寒偏身生赤粟子壯熱腹脹胸滿身上粟子紫黑色及腫者難治



烙肺俞二穴大腸俞二穴天臑穴手陽明二穴下廉二穴丹田穴承山二穴及手足心背心兩乳頭上三寸

蘇萸散 治肺黃

蘇萸

一兩乾者

柴胡

去苗

甘草

微炙

款冬花

蘆根

貝母

煨令微黃  
各五錢

右為散每服五錢水一大鍾生薑半分煎至五分去滓不拘時溫服

又方

用瓜蒂七枚為末每取一字吹鼻當下黃水為度

腎黃證候

腎黃者面色青黃腰背疼痛耳中颼颼百般聲響脚膝無力多吐嘔逆不能下食悲而不樂若兩脚浮腫齒黑如大豆者難治烙腎俞二穴膀胱俞二穴章門二穴魂舍二穴百會穴三里二穴及兩足心

附子散 治腎黃

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮各一分

生乾地黃

兩

右為散分三服每服水一大鍾煎至五分去滓不拘  
時溫服

又方

用藹苳子一合細研以水一大鍾煎至五分去滓不  
拘時溫服

又方

用蔓菁子一合細研入熱湯一小鍾攪濾去滓不拘  
時溫服

膽黃證候

膽黃者面色青黃多青少卧悲泣不定嗔怒無恒舌上生瘡唇口乾燥若喘粗不止者難治烙膽俞二穴上管穴風池穴下廉二穴心俞二穴肝俞伏兔二穴

車前子散 治膽黃

車前子 秦艽 甘草

微炙 犀角屑 各五錢

右為散每服五錢水一大鍾煎至五分去滓入生地黃汁半合不計時候溫服

腦黃證候

腦黃者由熱邪在於骨髓而腦為髓海故熱氣從骨髓  
流俞腦則令身體發黃頭疼眉疼烙百會天聰風腑穴  
石膏散 治腦黃

石膏

二兩秦朮

去苗

犀角屑

梔子仁

各一兩

甘草

炙五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫  
服

又方

梔子仁 大黃

炒

蘇萋根

各一兩

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

行黃證候

行黃者由瘀熱在脾臟但肉微黃而身不甚熱其人頭疼心熱不廢行立也烙脾俞二穴上管百會穴

治行黃

黃芩

麥門冬

去心

犀角屑

蘇萋根

梔子仁

各一兩

兩甘草錢五

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

癖黃證候

癖黃者由飲水停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不散脇下滿痛而身體發黃烙胃俞二穴上管胃脘穴

半夏散 治癖黃

半夏一兩湯洗七次去滑

前胡去蘆頭

栝榔三分

大黃

一兩杏仁三分

湯浸去皮尖

麩炒微黃

枳殼

五錢 麩炒去白

右為散每服二錢水一鍾煎至六分入生薑半分於前水一鍾同煎至六分去滓不拘時溫服

又方

芫花

醋拌炒令乾

桃仁

湯浸去皮尖麩炒各五錢

大黃

炒一兩

右為散不拘時以溫酒調服二錢

胃黃證候

胃黃者吐逆下利心腹氣脹或時煩悶不能飲食四肢



無力若唇口面目舌根黑者難治烙胃俞二穴上管穴  
太冲二穴

人參散 治胃黃

人參

去蘆頭

黃芩

赤茯苓

各一兩

蘇萸

一枚

枳殼

去穢炒

微黃甘草

微炙各五錢

右為散每服五錢匕水一大鍾煎至六分去滓不拘  
時溫服

鬼黃證候

鬼黃者面色或青或黑偏身皆黃狂言多譫皮膚乾枯  
舌根蹇澁心中恍惚恒見神鬼或自強言詐作惺惺若  
鼻中灰色舌黑毀裂衣裳者難治烙心俞二穴百會巨  
關穴章門二穴下廉二穴明堂神庭穴

丹砂散 治鬼黃

朱砂 錢五  
馬牙硝 一兩  
鐵粉 錢五

右細研如粉不拘時磨犀角水調服一錢

姦黃證候

姦黃者是鬼黃變入姦黃也面目徧身俱黃言語失錯  
心神狂亂詐姦默如不患人若不盥漱即口乾燥氣喘  
者難治先烙心俞肺俞二穴次烙胸前兩邊

犀角散 治姦黃

犀角屑 麥門冬去心 白鮮皮 姜蕤 黃芩 大

黃炒各一兩

右為散每服四錢水一鍾煎至五分去滓入生地黃  
汁五合不拘時溫服

走馬黃證候

走馬黃者眼目黃赤煩亂并狂言起卧不安氣力强壯  
唯愛嗔怒努力高聲打罵他人猶如顛醉若厥逆者難  
治烙肺俞二穴百會風腑穴關元穴腎俞二穴下廉二  
穴上管穴中管穴次烙手足心

竹葉湯

聖惠方

治走馬黃

方見前三十六  
黃走馬黃類

立黃證候

立黃者兩脚疼痛眼目黃澁小便色赤淋瀝不利心下

有氣塊者難治烙上管穴心俞二穴關元穴下廉二穴  
次烙舌下黑脉

治立黃

茅根

五兩

白朮

五錢

右為散每服五錢水一大鍾煎至五分不拘時溫服

黑黃證候

黑黃者面目或黃或黑眼目青色腰脊拘急口中兩頰  
有黑脉出口角者難治烙百會穴舌下黑脉口角兩旁

玉泉穴絕骨二穴足陽明二穴章門二穴次烙心俞二穴

治黑黃

聖惠方

用鬼臼一兩剉水一鍾半煎至八分去滓分為二服  
如人行五里再服

體黃證候

體黃者身黃面赤脚膝疼悶身上不熱心煩躁腹中微  
微有氣飲食或進或退好蓋衣被又欲冷處睡卧烙百

會背心及心一寸至二寸三寸四寸五寸

蒴藿湯浴之

聖惠方

治體黃

蒴藿

柳枝

桃條

各五錢

黃櫨木

五兩

右細剉用水三斛煎成二斛去滓以白礬末一兩攪和勻溫溫浴之

勞黃證候

勞黃者四肢無力骨節煩疼或時吐逆不能下食鼻中乾燥身熱疼悶漸覺羸瘦寒熱不定喘急氣粗難治烙

心俞二穴玉枕穴章門二穴百會勞宮二穴曲骨穴

柴胡散

聖惠方

治勞黃

柴胡

去苗

麥門冬

去心各一兩

茵陳

犀角屑

甘草

微炙

各五錢

鱉甲

二兩醋炙微黃去裙襴

右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時

溫服

脊禁黃證候

脊禁黃者腰背脊硬口噤不言喘急氣粗眼中出血心



神恍惚狀如中風烙百會心俞二穴上管穴肝腧二穴  
承漿穴魂舍二穴氣海穴下廉二穴絕骨二穴次烙鼻  
中柱及大權骨上

獨活散

聖惠方

治脊禁黃

獨活

麻黃

去根節  
各一兩

犀角屑

秦艽

去苗

桑白皮

甘草

炙微赤  
各五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服

食黃證候

食黃者聞食氣吐逆心腹脹滿身體疼痛喘急氣粗飲食不下或時虛汗腹中結燥亦似心黃夢見鬼神烙童門二穴關元穴脾俞二穴上管中腕穴

茅根散

聖惠方

治食黃腹中結燥

茅根

大黃

微炒黃各一兩

甘草

炙三分

右為散分作五服每服水一大鍾煎至五分去滓溫服似人行五七里再服以利為度

又方

聖惠方

商陸

菰蔞根

各一兩

右為散不拘時以蔥白煎湯調服二錢

火黃證候

火黃者偏身如火色兩腋下赤點子如粟米或似麥  
麩其點子紫色少者可治黑色多紫色少者難治烙百  
會穴天臑穴及背脊兩旁

治火黃

聖惠方

用生蓀萋根搗絞汁不拘時服半鍾

陰黃證候

陰黃者身如熟杏愛向暗卧不欲聞人言語四肢不收  
頭旋目痛上氣痰飲心腹脹滿面色青黃脚膝浮腫小  
便不利烙腎俞二穴胃脘穴陰部二穴

秦朮散

治陰黃

方見前  
陰黃類

氣黃證候

氣黃者上氣心悶腹脇脹滿兩脚冷疼睡卧不安小便

淋瀝狀似脾黃烙氣海穴肺俞二穴

治氣黃

聖惠方

用苦葫蘆子仁一兩微炒為末不拘溫水調下一錢  
以得吐為度

熅黃證候

熅黃者頭痛口苦舌根乾黑喘急不調鼻中出血心神  
煩亂作悵望之聲小便不利赤色如紅花汁若眼不能  
開者難治烙耳尖上五分及耳前後五分頭兩角太陽

穴百會穴玉枕穴心俞二穴足陽明二穴及足心

生地黄散

聖惠方

治燭黃

生乾地黄

一斤

犀角屑

黃芩

竹茹

麥門冬

去心

各一分

右為散以水二鍾煎至一鍾去滓分二服如人行五里再服

髓黃證候

髓黃者身體赤黃四肢不舉肌肉戰掉鼻中出血兩腳

疼悶一手專安額上身不壯熱愛冷處卧烙下廉二穴  
百會穴肺俞二穴接脊穴絕骨二穴

地骨皮散

聖惠方

治髓黃

地骨皮

柴胡

去苗人參

去蘆頭

羚羊角屑

甘草

炙微

赤各

一兩

右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入生地黃  
汁半合不拘時溫服

房黃證候

房黃者眼赤身黃骨髓煩疼頭目昏痛多饒睡卧體虛  
無力夜多夢泄神思不安腰脚酸疼小便黃赤烙腎俞  
二穴膀胱俞二穴足三里二穴關元穴氣海穴

鹿茸散

聖惠方

治房黃

鹿茸

去毛塗酥微炙

熟乾地黄

山茱萸

五味子

黃

蒼

剉牡蠣

燒為粉各一兩

右為末不拘時溫酒調下二錢

血黃證候



血黃者頭疼心悶眼暈欲倒胸膈熱擁鼻衄不止咽喉  
乾燥舌上生瘡若身熱如火頭面腫者難治烙心俞二  
穴百會穴足陽明二穴下廉二穴及手足心

羚羊角散

聖惠方

治血黃

羚羊角屑

黃芩

梔子仁

麥門冬

升麻

各一

兩

甘草

微炙  
五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至五分去滓入生地黃  
汁半合不拘時溫服

憂黃證候

憂黃者面色青黃手足疼痛多吐痰沫咳嗽不止兼吐  
濃血肌膚消瘦行步欲倒狀同勞黃烙背心次烙臍俞  
二穴心俞二穴

秦艽散

聖惠方

治憂黃

秦艽

去苗

柴胡

去苗

鱉甲

醋炙去裙

各一兩

黃耆

黃芩

犀

角屑

甘草

杏仁

湯浸去皮尖

麩炒各五錢

右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入生地黃

汁一合不拘時溫服

驚黃證候

驚黃者面色青黃心多驚悸口舌乾燥不肯眠卧即多  
言語狂亂身體壯熱烙風池二穴後烙天臑穴心俞二  
穴

犀角散

聖惠方

治驚黃

犀角屑

白鮮皮

麥門冬

去心

沙參

去蘆

茵陳

升

麻

朴硝

甘草

炙各

五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服

花黃證候

花黃者面色似紅花頭目疼腫寒熱如瘧恒多脚冷早起即輕午後發重進退不定狀同神祟烙百會穴手陽明二穴關元穴足陽明二穴

知母湯

聖惠方

治花黃

知母

地骨皮

柴胡

去苗

石膏

梔子仁

各一兩

右為散每服四錢以水一鍾煎至五分去滓入生地黃汁一合不計時溫服

瘥黃證候

瘥黃者面色萎黃憎寒壯熱頭痛不止口乾多渴四肢羸瘦不能飲食或好或惡進退不定烙肺俞二穴百會穴風府穴天聰穴太陽二穴玉枕穴及耳尖上五分

恒山散

聖惠方

治瘥黃

恒山 茵陳 赤茯苓 知母 鱉甲

醋塗炙微黃去裙襴

各一  
兩 甘草 錢五

右為散每服四錢以水一鍾入豉四十九粒煎至六分去滓不拘時溫服

水黃證候

水黃者身面青黃脚膝浮腫心腹脹滿上氣煩悶語聲不出烙關元伏兔穴下管穴足三里二穴承山二穴百會穴及背心

治水黃

聖惠方

大黃

劉微炒  
五錢

甘遂

煨微黃  
一錢

右搗碎以水一大鍾煎至六分去滓分為二服如人行五七里再服利即住服

蛇黃證候

蛇黃者腰背反張口苦舌縮咬嚼衣裳伏地似隱不多言語難蓋衣被少開眼目或叫喚心神不定烙手心背心足陽明二穴及氣海穴

羚羊角散

聖惠方

治蛇黃

羚羊角屑

麥門冬

去心

沙參

去蘆頭

各一兩

秦艽

去苗

茵陳

甘草

炙各五錢

右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服

牛黃證候

牛黃者舌如蠟色口作嚙不多言語或如牛吼若眼目頭面未變作深黃色者可治如舌上及身體黃黑色者難治烙承漿穴脾俞二穴及後心



犀角散

聖惠方

治牛黃

犀角屑

大黃

劉微炒  
各五錢

牛黃

細研

梔子仁

各一兩

右為散入牛黃麝香同研令勻不拘時以溫水調下  
一錢

鵝黃證候

鵝黃者十指青綠舌上生黑點唇口青黑身如黃銅烙  
下廉及足心胸前當心

治鵝黃

聖惠方

蘆根

判

生乾地黃

各一兩

茵陳

五錢

右為散每服五錢以水一大鍾煎至五分去滓不拘

時溫服

雞黃證候

雞黃者偏身爪甲並青黃夢寐見鬼神時自言笑烙風池二穴及鼻柱下三分手掌後橫紋三寸及足心

地黃飲

治雞黃

方見前三十  
六黃雞黃類

蚰蜒黃證候

蚰蜒黃者喉中似噎喘息不調四肢疼悶言語不正水  
米難下若頰內有青脉出口角手足亂動冷者難治烙  
手足心及口角內青脉尖頭及胸前

半夏散

聖惠方

治蚰蜒黃

半夏

湯洗七次去滑

射干

升麻

犀角屑

各一兩

甘草

炙五錢

錢

右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至六分去  
滓不拘時溫服

救急療三十六種黃

用雞子一顆并殼燒作灰研破醋一合又溫之總和  
頓服身體眼暗極黃者不過三顆鼻中虫出神效

諸疸附論

論曰諸疸證狀雖異大率多因酒食過度水穀相併積  
於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸所以發黃為疸也

方

秦艽飲子

濟生方

治五疸口淡耳脚弱微寒發熱小便

白濁

秦艽

去苗

當歸

去蘆酒浸

芍藥

白朮

官桂

去皮不見火

茯苓

苓

去皮

熟地黄

酒浸

橘紅

小草

川芎

各一兩

半夏

湯炮

甘草

炙各五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓  
溫服不限時候

犀角茯苓丸

治一切諸黃酒疸身面皆黃皮膚如塵

麴色心下堅滿小便赤黃心煩欲嘔倦怠少力不思

飲食

赤茯苓

茵陳葉

枳實

麩炒

前胡

去苗

甘草

炒

杏仁

去皮  
尖炒

半夏

洗七  
次

當歸

焙各  
三分

白朮

犀角屑

各一  
兩

右除杏仁為末入杏仁勻研煉蜜為丸如梧桐子大  
每服三十丸米飲下食後稍空時服量虛實加減

茵陳丸

治酒疸食氣女勞疸諸種黃疸及陰黃身面

悉黃大便澀少小便如梔子汁

茵陳

草龍膽

去蘆

大黃

炒

黃芩

枳殼

麩炒

各二兩

升

麻

三兩

柴胡

一兩

梔子仁

一分錢五分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸米飲下食後日進二服大小便俱利赤為度外臺秘要作湯以水八升煮取二升八合分溫三服若身絕羸加生地黃一升梔子加至七兩去大黃如氣力不羸用大黃

葶藶丸

治諸疸大小便澀

苦葶藶

炒

桑白皮

切炒

枳殼

麩炒

木通

各五錢

栝榔

木

香

錢各三

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三二十九食  
後橘皮湯下日三服

九疸秦椒散

胃疸食多喜飲

梔子仁主之

心疸煩心中熱

葛根主之

腎疸

其人脣乾

葶藶主之熬

舌疸渴而數便

石鍾乳主之

肉疸其

人小便白

凝水石主之研

脾疸溺赤出少惕惕若恐

括萆主之

肝疸胃熱飲多水激肝

白朮主之

髓疸目眶深多嗜卧



牡蠣澤肺疸飲少小便多秦椒焙出汗瓜蒂  
瀉主之主之一云膏疸

右名秦椒散各等分隨病所在加二分搗合篩下飯服五分日三服稍加可至方寸匕忌桃李雀肉

又方 夫人病疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸心中熱欲吐之即愈

右取千金翼苦參散吐良在上遍身黃部中七味者

是也苦參散方見諸黃類

又方

用好鹽一觔紙裏漬濕燒之取通赤內三升水中攪  
令稠手巾瀘過為一服以前二方服訖並吐出黃汁  
茵陳蒿湯一名淋熱  
湯聖惠方治諸般疸病面目身體發黃小  
便秘澁及時行瘀熱在裏鬱蒸不散

茵陳

三兩

山梔子

七枚

大黃

一兩

右以水五盞先煎茵陳二盞半却入大黃梔子煎至  
一盞半去滓分作二服空心服當利小便如皂角汁  
及黃赤色其黃從小便出也未愈再服五苓散亦可

發黃二藥亦可

薑蜜湯

百一  
選方

治諸疸通用或小便出血或小便如血

用之皆效

蜜

半

薑錢

十

右用新汲水一碗煎服逐日常服二次小便漸白及

出血黃疸遂瘥

礬石滑石散

千金  
方

治濕疸得之一身盡疼發熱面色

黑黃七八日後壯熱在裏有血下如狫肝狀小腹滿

者急下之身目盡黃小便不利其脉沉細及女勞疸

礬石

煨

滑石

各等分

右為末每服二錢麥粥飲調下日三服食前便利如血者效或汗愈或小便出血黃水為度

柴胡甘草湯 治熱疸

柴胡

一錢兩甘草

剉細

白茅根

一握

右以水二碗煎至七分時時服一日盡

治疸熱毒在內悶亂坐卧不安

聖惠方

用生髮燒灰存性為末新汲水調方寸日三服

治緩疸

本草

用黃耆一兩杵成散不拘時以溫水調二錢匕

疸病有五種謂黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸是也黃汗者身體四肢微腫胸滿不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出卒如水所致方

本草

用猪脂一觔溫令熱盡服之日三當下下則稍愈

治疸病有五黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身體四肢微

腫胸滿不得汗出如藥汁由大汗出卒入水所致後

方

用藍花一把水五升鼠矢兩頭尖者二七枚煮取二

升盡服溫覆取汗

小半夏湯

指南方

治濕疸

半夏

五分生薑八兩

用水七升煮至一升分五服

腎疸湯

試效方

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澀

升麻五錢 羌活 防風 藁本 獨活 柴胡各五錢

以上治腎疸目黃渾身黃 白朮五錢 蒼朮一錢 豬苓

四分 澤瀉三分 茯苓二分 以上治小便赤澀 葛根五分 甘

草三分 黃蘗二分 人參三分 麴六分

右件剉如麻豆大分作二服每服水三盞煎至一盞

去滓稍熱服食前服

療燥疸者手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而

復發本草

以虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

風疸 附論

論曰風疸者由風氣在於臟腑與熱相搏便發於黃小便或赤或黃好卧而心振面虛黑名為風疸也

方

犀角散 聖惠方

治風疸臟腑風熱相搏心神不安多卧

少起小便赤澀

犀角屑

黃連

各一分

赤芍藥

三分

茵陳

一分

白鮮皮

三分



梔子仁

柴胡

去苗

蕎麥根

子芩

各三兩

大黃

炒一兩五錢

錢

朴硝

二兩

貝齒

二十枚燒令赤細研

右為末每服不計時煎茅根湯調下二錢以利為度

牛黃散

聖惠方

治風疸心脾風熱面色虛黑身體皆黃

小便赤澀

牛黃

一分細研

犀角屑

三分

防風

三分去蘆

蕎麥根

大黃

炒各

甘草

五錢炙

白鮮皮

秦艽

各三分去苗

麥門冬

一兩去心

梔子仁

五錢

杏仁

三分湯浸去皮尖微炒黃

右為散研入牛黃令勻每服不拘時以竹葉湯調下  
二錢金銀湯下亦可

艾煎丸

千金方

治因傷風痰熱不解發於風疸舉身皆

黃小便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生艾

三月內採取束擣取汁銅器煎如膏

大黃

蒸

黃連

炒

蓯蓂仁

凝水石 苦參 葶藶

隔紙炒各等分

右為末以艾膏和得所凡如梧桐子大初服六七丸  
漸加至二十丸有熱加苦參渴加蓯蓂根小便澀加

葶藶小便黃加凝水石小便白加黃連大便難加大黃所加並倍之溫水服之

胃疸

附論

論曰已食如飢者胃疸也夫胃熱則能消穀今已食如飢者以胃氣但熱而無陰也然胃為足陽明陽明之脉絡屬於心陽明得熱則心火上行陽炎過矣單陽成疸心嘈煩而身面黃小便赤色也

方

瀉熱湯

聖濟總錄

治胃中有熱食已如飢不生肌肉面色

萎黃

大黃

生

麻黃

去根節

黃芩

去心各四兩

杏仁

去皮尖

赤茯苓

去皮甘草

陳橘皮

去白炒

芒硝

澤瀉

各三兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至八分去滓食後溫服

大黃瀉熱湯

聖濟總錄

治胃中熱食已即飢舌強腹脹身

重節疼

大黃

劉水浸一宿

甘草

各三兩

澤瀉

赤茯苓

去心皮黃芩

細辛

去苗葉

芒硝

陳橘皮

去白焙各二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓食後溫

服

茯苓湯

宣明論

治胃中積熟食已即飢面黃肌瘦胸滿

脇脹小便悶赤

赤茯苓

去皮

陳皮

去白焙

澤瀉

各三分

芍藥

白朮

各四兩

人參

桂

去皮各二兩

桑白皮

三兩

石膏

八兩

半夏

六兩洗七次

右粗擣篩每服四錢水一盞半入生薑少許煎至一

盞去滓不拘時溫服如病甚者加大黃朴硝各二兩

黃芩湯

聖濟總錄

治胃中熱甚食已即饑唇燥口乾

黃芩

石膏

各三分

赤茯苓

去皮

甘草

葛根

五加

皮

麻黃

去根節各五錢

柴胡

去苗一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞入生薑半分煎至八分

去滓食後溫服

梔子湯

聖濟總錄

治胃中熱盛食已復飢面黃肌瘦唇燥

口乾瀉熱

梔子仁

赤芍藥

犀角屑

赤茯苓

去皮

黃芩

去心

射干

大黃

炒各一兩

右為散每服四錢水一鍾半煎至八分去滓入生地黃汁一合蜜一大匙攪勻再煎一二沸食後分作二

次溫服

蘆根散

聖濟總錄

治胃中熱盛食已如饑常渴引飲滌熱

蘆根

括蔞根

麥門冬

去心各一兩

知母

甘草

各五

分  
赤茯苓

去皮  
三分

右為粗篩每服三錢水一盞入小麥五十粒竹葉二  
七片生地黃一分生薑半分煎至八分去滓食後溫  
服

黃連丸

聖濟  
總錄

治胃中熱盛食已如饑多渴心煩肌肉

羸瘦

黃連

去  
鬚

蕎麥根

各一  
兩

麥門冬

去心  
焙一  
兩五錢

知母

焙

茯苓

神

去木  
各  
三分



右為末煉蜜和丸擣百餘杵丸如梧桐子大食後粥飲下三十丸或牛乳汁下亦可

犀角湯

聖濟總錄

治胃實熱嘔逆不下食

犀角屑

葛根

各三分

枇杷葉

拭去毛炙黃

麥門冬

去心各一

兩

右為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至八分去滓不拘時溫服

穀疸

附論

論曰失饑飽甚則胃中滿塞穀氣未化虛熱熏蒸遂為  
穀疸其證心下懊悶頭眩心中忪怩鬱發黃小便不利身  
黃如橘是也寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非  
中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跗陽脉緊而數數  
則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脉浮為傷腎  
跗陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中  
苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡  
黃名曰穀疸

方

石韋湯

聖濟總錄

治穀疸跗陽脉緊而數緊則為實數則

為熱緊數相搏胃中苦熱骨節煩疼小便不利

石韋

去毛

木通

柴胡

去苗

茅根

各一兩五錢

梔子仁

芒

硝

各五錢

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日三

硃砂乳香丸

聖濟總錄

治穀疸食畢頭眩腹滿及酒疸脉

沉實

礪砂

乳香

安息香

各一兩五錢

杏仁

二十七粒去皮尖麩炒研

巴豆

三十粒去皮心膜用醋一盞煮至半盞研

右為細末棗肉丸如菽豆大每服五丸食後溫生薑

米飲下日二夕一

苦參梔子丸

聖濟總錄

治穀疸

苦參

龍膽

黃芩

去心各一兩

山梔子仁

五錢

右為細末以豬胆汁和擣五百杵丸如梧桐子大每

服二十丸食後米飲下日三

紅丸子

危氏方

治穀疸腹滿眩暈怫鬱怔忡酒疸通用

二陳湯加硝砂煎湯下

莪朮

三棱

各二兩醋煮一伏時

胡椒

一兩

青皮

三兩炒香

阿魏

一分

化醋

右為末別研陳倉米用阿魏醋煮米糊搜和丸如梧  
桐子大炒土硃為衣每服五十丸生薑甘草湯下

穀疸丸

一名苦參丸危氏方

治胃蓄瘀熱氣濁食穀不消大小

便不利脹滿不下食跗陽脉緊而數亦治因勞發熱  
熱鬱發黃

苦參

三兩

龍膽草

一兩

梔子仁

炒五錢

人參

三分

右為末以豬膽汁入熟蜜少許丸如梧桐子大以大  
麥煮湯下五十丸日三不知稍加之一方用牛膽一  
箇依上丸服

鬱金散

聖惠方

治穀疸唇口先黃腹脹氣急

鬱金

一兩

牛膽

一枚乾者

麝香

五分研

右為末每服五分新汲水調下不拘時

滌熱湯

一名茵陳蒿湯

治穀疸食畢頭眩心中怫鬱腹滿

見方

本門諸  
疸類

治食氣遍身黃腫氣喘不得食心胸滿悶

皂角

不蛀者去皮及子酥炙令焦為末一錢匕

巴豆

七粒去油

右以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸食後陳皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常食酒酒飲一方名黑虎丸

苦參丸

千金方

治穀疸食已頭眩心中怫鬱發黃由失

飢大食胃氣攻衝所致其腹必滿

苦參

一兩五錢

龍膽

五錢去蘆生用

右為細末以牛膽和擣三百杵丸如梧桐子大每服十五丸早晚食後煎大麥湯下或以生薑甘草湯下一方煉蜜丸以生麥門冬汁下一方用豬膽不用龍膽

穀疸食畢頭旋心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣



衝熏所致治之方

一名茵陳蒿湯出肘  
後方見本門諸疸類

茯苓梔子茵陳湯

衛生方

昔元顏正卿丙寅二月區區

官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱又以怒氣  
逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳心目俱  
黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀煩悶欲  
吐口生惡味飲食遲化時下完穀小便癃閉而赤黑  
辰巳之間發熱日暮則止至四月則尤甚其子以危  
急來請治之具說其事診其脉浮而緩金匱要略曰

浮則為風，緩則為痺。痺非中風，四肢苦煩，脾色必黃，  
痰熱以行，食穀則眩，穀氣不消，胃中苦濁，濁氣下流，  
熱流膀胱，身體盡黃，名曰穀疸。此之謂也。

梔子仁 蒼朮

白朮

各三分

豬苓

二分

茵陳葉一錢 澤

瀉 黃連

去鬚各二分

枳實

炒二錢

陳皮

二分

青皮

去白一分

茯苓

苓

去皮五分

漢防己

二分

黃芩

六分

右咬咀，都作一服，長流水三盞煎至一盞，去滓，溫服。  
食前一服，減半，又二服，良。愈。內經曰：熱淫於內，治以

鹹寒佐以甘苦又濕化於大行熱反勝之治以苦寒  
以苦泄之以淡滲之以梔子茵陳苦寒能瀉濕熱而  
退其黃故以為君難經云并主心下滿以黃連枳實  
為苦寒泄心下痞滿肺主氣今日傷其氣故身體麻  
木以黃芩苦寒瀉火補氣故以為臣二朮苦甘溫青  
皮苦辛溫能除胃中之濕熱去其壅滯養其正氣漢  
防己以苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平茯苓豬苓  
甘平導膀胱中濕熱利小便而去癰閉也

胡椒紅丸子

如宜方

治穀疸因飢中過食傷胃蘊熱瘀

滯腹滿心鬱怔忡

三稜

陳皮

青皮

莪朮

各一兩

胡椒

乾薑

各二兩

兩

右為末醋糊丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸  
空心薑湯煎二陳湯加砂仁下

酒疸

附論

論曰胃虛穀少醉以入房冒犯風邪胃中熱毒隨虛入

裏小便黃赤濕毒內聚心下懊痛熏發肌肉則身目發黃赤斑足脛浮腫或下之早則變為黑疸令人心如病饑大便黑瘀皮膚不仁治法既宜先去濕毒後分小水餘隨證治之如心下懊懣而熱不能食則欲吐名曰酒疸夫酒疸者必小便不利心中熱足下熱欲吐鼻燥脉浮者先吐之沈弦者先下之欲嘔者吐之即愈大抵五疸唯酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盈石而不醉者有濡唇而輒亂者以醞釀而成有大熱毒

滲入百脉為病則不特發黃溢於皮膚為黑疸流於清氣道中則眼黃鼻腫種種不同故方中論酒疸外有肉疸黑疸癰勞後疸令人恍惚失常等數證不同

方

黃連丸

聖濟總錄

治酒疸心面黃心懊痛小便黃赤不利

黃連

去翳

黃蘗

去皮

黃芩

去心

大黃

炒

梔子仁

鬱金

黃蘗子

去上

秦艽

去苗

貝母

去心

甘草

炙

款冬花

黃

明膠

炙令燥

白芥子

各五錢

右為末粳米飲丸如梧桐子大每服十丸煎麥門冬湯下

半夏湯

千金方

治酒疸發黃身無熱言語了了腹滿欲

嘔心煩足熱或成癥癖心中懊懣其脉沉弦或緊細千金方云酒癖陰胸心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致

半夏

洗去滑

茯苓

白朮

各三兩

前胡

枳殼

麩炒去穢一作

枳實甘草

炙

大戟

炒各二兩

黃芩

茵陳

當歸

各一兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓

空心服

當歸白朮湯

三因方

治酒疸發黃結飲癖在心胸間心

下從橫堅滿骨肉沉重逆害飲食小便赤黃此由本虛飲食生冷與脾胃痰結所致其脉弦漚

白朮

茯苓

各三兩

當歸

黃芩

茵陳

各一兩

枳實

乾炒去穢

前胡

甘草

炙

杏仁

乾炒去皮各二兩

半夏

湯洗七次二兩



錢五一方加乾葛二兩

右為散每服四錢水二盞薑七片煎至七分食前服

凡酒疸熱疸大便秘者可服三黃丸方見積熱門

赤茯苓聖惠方治心下堅而小便赤澀是酒疸之後

宜服此方

赤茯苓 茵陳 枳實楚炒去白微黃 白朮 前胡去蘆大

黃各一兩 甘草炙 當歸 半夏湯洗七次去滑 杏仁湯浸去皮尖麤

炒微黃  
各三分

右為末煉蜜和凡如梧桐子大每服三十丸粥飲下

茯苓丸

千金方

治酒疸心下縱橫堅而小便赤

茯苓

茵陳

乾薑

各一兩

白朮

熬

枳實

各三十銖

半夏

杏仁

各十八銖

甘遂

六銖

蜀椒

當歸

各十二銖

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心服三九日三稍稍

加以小便利為度千金翼加木通一兩大黃十八銖

名茵陳丸治黑疸身體闇黑小便澁

二石散

一名凝水石散千金方

治肉疸飲少小便多如白泔色

因酒所致其脉弦滑

凝水石

煨水飛

白石脂

煨

蓯蓂根

桂心

各一兩一錢

皂

繇子

酒浸別研

知母

各三分

右為末每服二錢大麥飲調下日三服五日知十日

瘥

茵陳湯

聖濟總錄

治酒疸心中懊懣痛小便黃赤

茵陳

赤茯苓

去皮

葛根

各三兩

梔子仁

半分

蓯蓂根

三分

秦艽

去苗土

升麻

各一兩

右粗擣節每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫

服日三

桔梗湯

聖濟總錄

治酒疸腹滿如水狀心中懊懣不能下

食時時欲吐

桔梗

剉炒

百合

赤茯苓

去黑皮

桑白皮

枳殼

去穢炒

各一兩五錢

木通

二兩

枳榔

五枚

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓食

前溫服良久再服

白朮湯

一名桂朮湯  
三因方

治酒疸因下後久為黑疸目青面

黑心中如啖韭薤狀大便正黑皮膚不仁脉微而數

桂心

白朮

枳實

麩炒  
去穰

京豉

乾葛

杏仁

甘草

各五錢

右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓食前服

一方有柴胡無桂心

治酒疸

經驗良方

茵陳

葛花

黃連

神麴

京三稜

細辛

各等

分

右為細末每服三錢用溫酒或鹽湯調無時服

葛根湯 治酒疸因下後久為黑疸目青面黑心中如

啖韭蘘狀大便正黑小便赤或面黑脉微而數

葛根

二兩

枳實

去穢炒

梔子仁

豉

各一兩

甘草

炙五錢

右為散每服四錢水一盞半煎至八分去滓不拘時

溫服

瓜蒂丸

一名牛膽丸

治酒疸遍身黃麴塵出

瓜蒂

大黃

炒

羌花

炒各一兩

牛膽

一枚

羌花

醋炒五錢

右為末以清酒二升漬一宿煎至一升去滓入牛膽汁微火煎稠丸如梧桐子大每服五丸溫熱水下得吐利為度

六物湯 治酒疸腹脹

萆撥

荊芥穗

不蛀川楝子

連皮核用

生薑母

軟

烏梅

甘草

各等分

右於石臼中搗細用磁器盛以自己滿腹小便去其

首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星一宿拂明飲其汁續用車前子茵陳竹園萸煎湯乘熱調五苓散服自覺黃水從小便出而腹不脹

追毒飲 治酒疸遍身發黃

狗脊

去毛  
一兩

白芥子

甘草

各一  
錢

右細剉用酒一升煎取半升去滓分溫二服以利下為度

乳香礞砂丸

治酒疸心下懊痛身目發黃

方見本門  
穀疸類



大黃湯 治酒疸心下懊痛脰腫溲黃面發赤斑面不甚熱或乾嘔

大黃

剉炒

枳實

去穢  
麩炒

梔子仁

各一兩

豉

炒三合

右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服  
日三一方無枳實

艾葉湯 治酒疸身目俱黃心中懊痛

生艾葉

一握無生者  
乾者煮亦得

麻黃

去根節  
二兩

大黃

炒一兩  
五錢

右剉如麻豆大每服四錢酒一盞半入大豆半合同

煎至八分去滓食前溫服

黃耆木蘭散 治酒疸心懊痛足脛滿又小便黃面發

赤斑或黃黑色此由飲酒大醉當風入水所致

黃耆

二兩 木蘭皮

一兩

右為末每服二錢七食前熱酒調下日三

治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤斑黃黑由大

醉當風入水所致

肘後方

芫花 椒目

右等分燒末服五分立愈

如神散

危氏方

治酒毒不散發黃久久浸清流入清氣

道中宜引藥內鼻滴出黃水愈

苦匏子

去壳

苦葫蘆子

各三七箇

黃黍米

三百粒

安息香

二皂

子大

右為末以一字搐入鼻滴盡黃水一二升或過多則

以黍穰燒灰麝香末各少許搐鼻立止

治酒疸

百一選方

弱葉

燒灰

神麴

炒各五錢

右為細末每服二錢或酒米飲調下食前服甚妙

治酒疸

百一選方

用田螺七箇水養出泥搥碎取螺頭細剉以熱酒浸頻服永類鈴方用小螺螯煮肉并汁常服

小麥飲

聖濟總錄

治酒疸

用生小麥二合以水一盞絞取汁食後頓服一方用三升杵和水取汁五合服之

酒蒸黃連丸

直指方

治酒疸

用黃連去鬚淨四兩剉碎以酒洒醃一宿日乾為末  
米糊為丸如梧桐子大每服三四十丸以二陳湯加  
葛根茵陳薑棗煎湯送下

治酒疸及治熱疸

直指方

用土瓜搗取汁任服

除煩熱解酒疸目黃

本草

以黃蘗木煮服之

治酒疸

用明眼草研細調喫

大黃丸

指南方

治酒疸脉沈腹脹滿大便秘

方見本門黃疸類

治酒疸目黃及野病熱利下血

本草

用黃屑水煮服之

治酒疸

本草

用苜蓿搗取汁服一升令人吐利即愈

治酒疸黃色通身者

取萱草根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之

治酒疸

以鹽麩子根白皮搗碎米泔浸一宿平旦空心溫服  
一二升

瓜蒂散

治酒疸脉浮腹滿欲嘔宜吐之

方見本門  
黃疸類

木通散

治酒疸通身黃腫

木通

剉

甘草

炙

木香

檳榔

剉

麻黃

去根

秦艽

去苗

土

瞿麥穗

乾薑

炮

右等分為散每服一錢白湯點服空心食前日三病甚者用猪膽一枚去汁一半入巴豆一粒薤白二寸在膽內以線繫定同青橘皮少許以水一盞半煎熟濾去膽取藥湯調下一錢匕

女勞疸

附論

論曰脾胃素有濕熱或緣大暑醉飽房勞過度引熱歸腎濕氣交攻小水不利小腹堅脹濕氣流於肌肉之中則四肢身面發黃故謂之女勞疸然其症又有額心黑



微汗出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利腹如水  
狀則不治三因症治云夫交接輸瀉必動三焦上焦屬  
心中焦屬脾下焦屬腎動則熱熱則慾火熾因入水中  
中焦熱鬱故能發黃下焦氣勝故額黑上焦起血隨熱  
瘀行大便溏黑貴勝人有男女同室而浴者多成此病  
攝生者不可不知

方

辰砂妙香散 治飲酒行事酒熱瘀於心經致成黃疸

茯苓

茯神

去木

山藥

炮

遠志

水浸去心

梗炒

黃耆

炙各一兩

人

參

甘草

炙

北梗

各五錢

木香

辰砂

另研各三錢

麝香

一錢

服

右為末每服二錢加辰砂少許用茵陳湯調下日三

服

人參飲

一名人參散

治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失

常

人參

白芍藥

括萎根

枳殼

去穢

茯神

酸

棗仁

各一兩

熟地黃

二兩

甘草

炙一兩

右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓食後臨

卧溫服

驚甲湯

治女勞疸手足煩熱肢節疼痛小腹拘急時

有虛汗

驚甲

去裙襴醋炙  
一兩五錢

柴胡

茵陳

地骨皮

赤芍

藥

梔子仁

黃耆

麥門冬

去心焙  
各三兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時

溫服

牡蠣湯

治女勞疸額上汗出四肢虛煩日晡發熱小

便自利

牡蠣

燒令赤

龍膽

升麻

麥門冬

去黑心炒

甘心

炙各三分

犀角

鎊

藁本

桂

各五錢

右為散每服四錢水一大盞煎至八分去滓熱服溫

覆即避風寒

秦朮散

治勞黃心脾熱壅皮肉面目悉黃

秦艽

去苗土

犀角屑

赤芍藥

各五錢

茵陳

麥門冬

去心柴胡

去苗各一兩

大黃

炒二兩

黃芩

三分

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服日三四服以利為度

治心熱勞黃口乾舌澀皮肉面目俱黃上氣喘急宜服此方

黑豆

二升淨以水四升煎取二升去豆

生地黃汁 麥門冬汁

生藕汁

括萎根汁

各三合

蜜

右藥并豆汁微火煎如膏於磁器內盛每服一茶匙不拘時服

龍膽湯 治女勞疸額上黑汗出手足中熱四肢煩疼薄暮發熱小便自利

龍膽

去蘆

甘草

炙

麥門冬

去心

柴胡

去蘆

升麻

犀角

各三

分牡蠣

一兩燒研如粉

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓入生地黃汁半合再煎一二沸不拘時溫服

犀角湯 治女勞疸及勞氣熱渴額上汗出手足俱熱

小便赤澀

犀角

鎰

龍膽

各一兩

升麻

甘草

炙各五錢

麥門冬

去心焙三

分

右為細末山藥糊三錢水一盞入生薑一片棗一枚  
拍碎煎至七分去滓入生地黃汁一合食後溫服

小鬼絲子 治色疸

鬼絲子

五兩洗酒浸一宿研焙

石蓮肉

二兩

白茯苓

一兩

山藥

一兩

留一半  
打糊

右為末山藥糊丸如梧桐子大每服五十丸用芎藭湯下加多茯苓下

四君子湯

直指方

治色疸

人參 白朮 白茯苓 甘草 加後黃蘗 白

芍藥 黃耆 白扁豆

各一兩

右剉細每服三錢薑五片棗二枚煎服

苦參丸

聖濟總錄

治女勞疸



苦參

三兩

龍膽

二兩

梔子仁

三兩

五錢

右為末以牛膽汁和丸如梧桐子大每服二十九溫水下日二夜一稍加至四十九本草用猪膽服

硝石散

一名礬石  
散十金方

治女勞疸其腹臃脹膀胱急欲作

水狀大便黑者非水其脉滑腹滿者難治身目皆黃發熱惡寒小腹滿急大便難由太勞大熱房室損傷得之交接後入水所致治之方

硝石 礬石

并研各等分

右為末每服一錢用大麥粥飲調下蓋衣出汗其病  
隨小便出者色黃大便出者色黑是效

滑石散

千金方

治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小腹

急足下熱其脉浮緊腹滿者難治

滑石

石膏

煨等分一作白礬

右為末大麥粥飲調下二錢日三四小便極利則瘥

豬膏髮煎

本草

治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿

急小便難由大熱大勞交接後入水所致

方見本門諸黃類

黑疸 附論

論曰諸疸黃疸酒疸女勞疸久不已皆變為黑疸其狀  
小腹滿身體盡黃額上黑足下熱大便黑是也黃本脾  
病脾者土也脾病不已傳其所勝腎斯受之腎為水臟  
其經足少陰其色黑病在腎故小腹滿色黃大便黑足  
下熱是皆少陰經受病之證

方

當歸湯

聖濟  
總錄

治諸疸久不瘥變成黑疸

當歸

三兩

桂 去皮

麥門冬

去心 一兩五錢

黃芩

去黑

黃耆

乾薑

炮

赤茯苓

去皮

芍藥

黃連

去鬚

石膏

人參

甘草

炙各三兩

大黃

炒

茵陳

各一兩

右剉如麻豆每服二錢七分去滓溫服日三一方無

黃耆

茵陳蒿丸

聖惠方

治黑疸身體闇黑小便澀

茵陳蒿

赤茯苓

去皮

葶藶子

炒各一兩

枳殼

去穰炒

白朮

各一兩一分

杏仁

湯浸去皮尖炒三分

蜀椒

去閉口及目子炒令出汗

當歸

焙

乾薑

炮

甘遂

炮各一分

大黃

醋炒

半夏

湯洗七次去滑焙各一錢

右為末煉蜜搗三五百杵丸如菉豆大每服十九空

心米飲下日三一方有木通無乾薑溫水下

瓜蒂散

一名赤小豆散聖惠方

治黑疸身體及大便並黑及黃

疸久不瘥

瓜蒂

一分雄黃

研一錢先用醋煮

甘草

炙一兩

瓜蒌

二兩

右為細散每服一字用赤小豆二十粒茯苓一分水

一盞煎至六分去滓調服須臾當吐吐止即愈

硝石散 治日晡所發熱而及惡寒此為女勞而得之

膀胱急小腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞之病非水也腹

滿者難治


方見本門  
女勞疸類

治黃疸變成黑疸醫所不能療多死急治之方

千金方

用土瓜根汁每日空心服半錢即半盞其病隨小便出即愈然須量病人強壯者可服半盞羸人一合如無生者即剉乾的一兩水一盞半煎取七分去滓頓

服羸量減



普濟方卷一百九十六